



Zalecenia dietetyczne po zabiegu ślinianki przyusznej

Pacjent po zabiegu ślinianki przyusznej przez trzy doby jest na diecie „0” (tzn. że nie może przyjmować płynów i pokarmów doustnie).

Dobowe zapotrzebowanie na płyny jest uzupełniane przez wlew dożylny.

Następnie wskazana jest dieta półpłynna (potrawy należy jeść zmiksovane, należy unikać żucia twardych pokarmów).

Dieta powinna być lekkostrawna, wykluczyć należy produkty ostro przyprawione i kwaśne.

Opracował: dr n. med. Piotr Wardas

Źródło: Latkowski B. Otorynolaryngologia - kompendium, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007



Zalecenia dietetyczne po zabiegu ślinianki przyusznej

Pacjent po zabiegu ślinianki przyusznej przez trzy doby jest na diecie „0” (tzn. że nie może przyjmować płynów i pokarmów doustnie).

Dobowe zapotrzebowanie na płyny jest uzupełniane przez wlew dożylny.

Następnie wskazana jest dieta półpłynna (potrawy należy jeść zmiksovane, należy unikać żucia twardych pokarmów).

Dieta powinna być lekkostrawna, wykluczyć należy produkty ostro przyprawione i kwaśne.

Opracował: dr n. med. Piotr Wardas

Źródło: Latkowski B. Otorynolaryngologia - kompendium, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007